

USO DE EPIS ANTE RIESGO DE COVID19 (NO INCLUYE PROTECCIÓN HABITUAL)

REVISADO 21/04/2020		MASCARILLA AL PACIENTE	MASCARILLAS QUIRURGICAS	MASCARILLAS FFP2 / MASCARA CON FILTRO P2 MASCARILLAS FFP3 / MASCARA CON FILTRO P3	GAFAS PROTECCIÓN	GAFAS INTEGRALES	PANTALLA FACIAL	GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES	BATA RESISTENTE LIQUIDOS / BATA + DELANTAL IMPERMEABLE	MONO COMPLETO
URGENCIAS	CIRCUITO NO RESPIRATORIO	•	•				•	•		
	CIRCUITO RESPIRATORIO	•	•	•		•	•	•	•	
OBSERVACIÓN	CIRCUITO NO RESPIRATORIO (STC)	•	•				•	•		
	CIRCUITO RESPIRATORIO	•	•	•		•	•	•	•	
RADIOLOGÍA	CIRCUITO RESPIRATORIO	•	•	•			•	•	•	
	CIRCUITO NO RESPIRATORIO	•	•				•	•		
CCEE. INTERNA		•	•		•			•		
CCEE. ANESTESIA		•	•		•			•		
CCEE. DIGESTIVA		•	•		•			•		
CCEE. CARDIOLOGÍA		•	•	eco. transesofágica	•			•		
NEUMOLOGÍA	SIN AEROSOLES	•	•		•			•		
	CON AEROSOLES			•		•	2 EN EL SERVICIO	•	•	
CIRUGÍA GENERAL		•	•		•		•	•		
GINECOLOGÍA		•	•		•		•	•		
TRAUMATOLOGÍA		•	•		•		•	•		
UROLOGÍA		•	•	mitomicina	•		•	•		
OTORRINOLARINGOLOGÍA	SIN EXPLORACIÓN	•	•		•			•		
	EXPLORACIÓN OROFARING.			•		•	2 EN EL SERVICIO	•	•	
OFTAMOLOGÍA		•	•		•			•		
INYECC. INTRAVITREA OPT.		•	•		•			•		
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ALTA						2 EN EL SERVICIO	•	•	
	BAJA	•	•	•			2 EN EL SERVICIO	•	•	
FIBROSCOPIA				•			2 EN EL SERVICIO	•	•	
UCI	CIRCUITO RESPIRATORIO	•	•	•		•	•	•	+ calza	Ingreso
QUIROFANO	QUIROFANO	•	•	•		•	STOCK DE 10	doble guante latex / compatible	•	
	URPA/UCI 2	•	•	•		•	STOCK DE 10	•	+ calza	Ingreso Si COVID
HOSPITALIZACIÓN	COVID19/ALTA SOSPECHA	•	•	•		•	•	•	•	
	ZONA LIMPIA (COVID)	•	•				•	•		
	QUIRURGICOS/OTROS MI	•	•		•		STOCK DE 8	•		
RESTO DE ÁREAS	RESPIRATORIOS NO COVID	•	•	SI AEROSOLES	•	SI AEROSOLES	STOCK DE 8	•	SI AEROSOLES	

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

TODOS PACIENTE Y PROFESIONAL DEL HOSPITAL LLEVARÁ COMO MÍNIMO UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA O COMPATIBLE
EL USO DE LA MASCARILLA QUIRÚRGICA O SIMILAR ES PARA PROTEGER A NUESTRO ENTORNO, SI EL PACIENTE U OTRO PROFESIONAL PRÓXIMO A NOSOTROS NO LA LLEVA. NO ESTAMOS PROTEGIDOS
ES IMPRESCINDIBLE UN BUEN USO DE LA MASCARILLA. USO CONTINUADO DURANTE LA JORNADA LABORAL, SIN CAMBIOS Y RETIRÁNDOLA LO MENOS POSIBLE PARA NO MANIPULARLA EVITANDO RIESGOS.

MASCARILLAS FFP2/FFP3

EL USO DE MASCARILLA FFP2 SE LIMITARÁ A ZONAS COVID-19 CON PROXIMIDAD INFERIOR A 1 METRO DEL PACIENTE Y/O CUANDO SE REALICEN TÉCNICAS QUE GENEREN AEROSOLES EN PACIENTES CON SOSPECHA
EN ZONAS DONDE SE REALICEN TÉCNICAS QUE GENEREN AEROSOLES Y SE SOSPECHE QUE EL PACIENTE PUEDA SER POSITIVO SE RECOMIENDA EL USO DE FFP2
EL USO DE MASCARILLA FFP3 SE LIMITARÁ A LAS TÉCNICAS DE ALTO RIESGO QUE GENEREN AEROSOLES EN PACIENTE COVID-19 CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD

GAFAS

EN LAS ZONAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE GAFAS DE PROTECCIÓN TANTO PARCIALES COMO INTEGRALES (GENERACIÓN DE AEROSOLES), HABRÁ UN STOCK FIJO. CADA SERVICIO SE HARÁ CARGO DE SU CUIDADO Y LIMPIEZA.
LOS PROFESIONALES A LOS QUE SE LE ENTREGUE UNAS GAFAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, SERÁN RESPONSABLES DE SU CUSTODIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
LAS GAFAS INTEGRALES SE UTILIZARÁN CUANDO SE REALICE ALGUNA TÉCNICA QUE GENERE AEROSOLES.
LA LIMPIEZA DE ESTOS OBJETOS SE REALIZARÁ CON SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE SUPERFICIES (MELISEPTOL, DILUCIÓN LEJÍA 1:10 O SIMILAR)

PANTALLAS

EN LOS SERVICIOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE PANTALLAS FACIALES DURANTE TODA LA JORNADA, SE SEGUIRÁ EL CIRCUITO DE RECOGIDA/ENTREGA Y DESINFECCIÓN DE LAS MISMAS ESTABLECIDOS.
LOS SERVICIOS DONDE HAYA UN STOCK DE PANTALLAS FACIALES FIJO, SE HARÁN CARGO DE SU CUSTODIA, CUIDADO Y DESINFECCIÓN (MELISEPTOL, LEJÍA 1:10 O SIMILAR) DESPUÉS DE SU USO.
LOS SERVICIOS QUE TENGAN UN STOCK DE 10 PANTALLAS FACIALES (UCI/QUIROFANO), SEGUIRÁN EL CIRCUITO DE LIMPIEZA CUANDO SEA NECESARIO (USO PROLONGADO EN EL TURNO)
* SE ENTREGARÁ UNA PANTALLA EN EL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUE GENEREN RIESGO DE SALPICADURAS. LOS PROFESIONALES SE HARÁN CARGO DE SU CUSTODIA, CUIDADO Y DESINFECCIÓN

GUANTES

ES IMPRESCINDIBLE EL USO ADECUADO DE GUANTES. NO USO CONTINUADO DE GUANTES SIN CONTACTO CON PACIENTES. SÓLO CUANDO SEA NECESARIO
EN LOS SITIOS DONDE HAYA POSIBILIDAD DE LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN, REDUCIR EL USO DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA E INTENSIFICAR EL LAVADO DE MANOS.
EN EL CASO DE NO DISPONER DE GUANTES DE NITRILLO, UTILIZAR DOBLE GUANTE DE LÁTEX SEGÚN DISPONIBILIDAD O DOBLE GUANTE DE VINILO.

BATAS

EN LAS ZONAS COVID-19, SE RECOMIENDA EN PROXIMIDAD INFERIOR A 2 METROS DEL PACIENTE, EL USO DE BATA IMPERMEABLE. EN AUSENCIA DE ESTA, USO DE BATA QUIRÚRGICA REFORZADA + DELANTAL IMPERMEABLE
EN AUSENCIA DE LAS ANTERIORES, SE RECOMIENDA EL USO DE BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE + DELANTAL IMPERMEABLE O SIMILAR.
EN ZONAS COVID-19 USAR CALZAS O COMPATIBLES SEGÚN DISPONIBILIDAD CUANDO PUEDA HABER ALGÚN TIPO DE SALPICADURA

GORROS/PAPIS/CALZAS

NO ES NECESARIO EL USO DE GORROS Y PAPIS EN LA ATENCIÓN A PACIENTES COVID
EL USO DE GORROS ESTÁ INDICADO PARA LA RECOGIDA DEL PELO LARGO
EL USO DE PAPIS ESTÁ INDICADO PARA AJUSTAR EL PIE A LA CALZA
LAS CALZAS ESTÁN INDICADAS CUANDO HAY RIESGO DE VERTIDO DE LÍQUIDOS (QUIROFANO, ÉXITUS...)

RECUERDA SIEMPRE LAS OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN
USO DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO CON DESINFECTANTE
DISTANCIA ENTRE COMPAÑEROS DE 2 METROS
NO TOCARSE BOCA, NARIZ NI OJOS
TOSEAR CUBRIENDO NARIZ Y BOCA CON LA FLEXURA DEL CODO