

# COVID 19 – Procedimiento para la realización de tests rápidos en profesionales

1

**Objetivo:** cribado IgM / IgG de todos los profesionales

2

**Priorización:** realización de pruebas de forma escalonada priorizando zonas de mayor riesgo

3

**Procedimiento:** puntos de extracción en cada servicio. Información de resultados

# Objetivo

- Estudio de seroprevalencia (IgG/IgM COVID-19) en profesionales del HSJDA
- Detección de posibles casos positivos asintomáticos para aislamiento

Coordinado desde Salud Laboral como actividad de Vigilancia de la Salud de los trabajadores.

# Priorización

Actuación de forma escalonada en 4 fases según riesgo:

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Servicios que atienden pacientes COVID positivos, pacientes con alta sospecha, o posibilidad de contacto con material contaminado	Servicios en los que ha habido agrupación de casos positivos entre profesionales	Resto de servicios y áreas asistenciales del hospital. Servicios con menor número de casos positivos entre profesionales.	Servicios y áreas no asistenciales y de soporte
447 profesionales	384 profesionales	87 profesionales	123 profesionales

# Priorización

## Servicios y áreas en cada una de las fases

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Fisioterapia Hospitalización 1 impar Hospitalización 1 par Laboratorios Medicina intensiva Medicina interna Neumología Prevención UCI Urgencias	Anestesia y Reanimación Cirugía General Consultas externas Hospitalización 2 Impar Hospitalización 2 Par Hospitalización 3 Impar Hospitalización 3 Par Hospitalización 4 Par Oftalmología Otorrinolaringología Pediatría Pruebas Digestivas Quirófanos Radiología General Traumatología Urología	Admisión Almacén Cardiología Digestivo Endoscopia Especialistas internos residentes Ginecología Hospital de día	Administración Dirección Farmacia Guardería Informática Laboratorios ULM Prevención Mantenimiento
447 profesionales	384 profesionales	87 profesionales	123 profesionales

# Procedimiento

## **FASE PREVIA: Salud laboral**

- Creará en la historia clínica (convencional) de cada uno de los profesionales un episodio MPV con la solicitud de prueba
- Identificación de puntos de extracción con coordinadores de enfermería y jefes de servicio. Comprobación de dotación de material de extracción y EPIS necesarios en cada punto.
- Elaboración de material informativo para profesionales en el blog de prevención. Difusión del mismo por los canales habituales.

# Procedimiento

## FASES 1 a 4

- Toma de muestras en los puntos de extracción
- Información de resultados en TiCares por parte de Laboratorio
- Informe de resultados a los profesionales por teléfono vía Salud Laboral.

**Personal para extracción:** personal de enfermería de cada área o servicio. Personal de enfermería de Salud Laboral para servicios no asistenciales (informática, administración – dirección, almacén y mantenimiento)

# Procedimiento

## Toma de decisiones según resultados

En profesionales asintomáticos

Ig M	Ig G	Actitud a seguir
Negativa	Negativa	Vigilancia de síntomas
Positiva	Negativa	Fase inicial de la infección Retirada del trabajador de la actividad Realización de PCR
Positiva	Positiva	Fase inicial de resolución Retirada del trabajador de la actividad Realización de PCR
Negativa	Positiva	Fase final, profesional inmunizado

**Importante:** los profesionales inmunizados deben seguir manteniendo **TODAS** las medidas de protección que estén indicadas para su puesto de trabajo.